

Morus nigra L.

10 Exemplares no Parque



Família

Moraceae

Nome Comum

amoreira-negra, amoreira, moreira-negra, amoras-da-horta

Origem

Oriundo da Ásia Menor e amplamente cultivada na Europa central.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

(/glossary/137)

Árvore (/glossary/137) de 8 a 10 m de altura, de copa (/glossary/186) den bastante ramificada. (/glossary/458) As folhas são inteiras, por vezes lobuladas, cordadas na base, obtusas, com a margem ligeiramente crenadentada; escábridas na face superior e pubescentes na inferior; medem 5 a 10 cm por 4 a 9 cm. As flores masculinas dispõem-se em espigas grossas prolongadas; as femininas são mais curtas e arredondadas, ovóides, amb flores estão suspensas por curtos pedúnculos. Os frutos dispõem-se agrupados em infrutescências em forma de espigas subsésseis, muito mais compridas que os pedúnculos. As margens do receptáculo do fruto e dos estigmas são sempre (/glossary/484) pilosos. As amoras, são denominada por soroses, têm de 2 a 2,5 cm de comprimento, são oblongas, inicialmente de cor rosada e posteriormente vermelhas escuras, altura em que se podem consumir.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

sorose (/glossary/497)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

espiga

(inflorescência indefinida simples, com flores sésseis sobre o eixo comum (ou ráquis), mais ou menos alongado.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

crenada

(provida de corte arredondados na margem)

Limbo da Folha

cordado

(ou cordiforme, em forma convencional de coração, isto é, de contorno ovado-triangular, com lobos arredondados e subiguais na base.)

Habitat

Desconhece-se ao certo o habitat (/glossary/311) natural (/glossary/133) (*Morus nigra*, como espécie (/glossary/244) cultivada prefere solos profundos e ricos em matéria orgânica e humidade. Não tolera longos períodos de seca.

Observações

O pólen (/glossary/436) das amoreiras, apesar de raramente, pode causar alergias respiratórias. Cultivada na Europa pelos (/glossary/414) seus frutos prefere solos profundos, ricos em matéria orgânica e humidade. Não tolera longos períodos de secura.

Aplicações

(/glossary/137)

Árvore (/glossary/137) ornamental (/glossary/385) muito utilizada em parques e jardins. Os frutos podem ser consumidos frescos e possuem um sabor adocicado, ligeiramente ácido. São muito ricos em vitamina C, sendo considerado um adstringente (/glossary/112) suave. Podem ser usados para preparar compotas ou para fazer bebidas refrescantes. A casca (/glossary/171) das raízes é muito eficaz para eliminar os parasitas intestinais. A madeira pode ser utilizada para tornear; é escura e muito dura. O xarope de amoreira-negra pode ser utilizado para inflamações da garganta e da boca.

amoreira é também uma planta têxtil, produtora de fibras. As folhas e os frutos são também usados para tingir. As folhas de amoreira são ainda utilizadas na alimentação dos bichos-da-seda.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

