

Fraxinus ornus L.

6 Exemplares no Parque



Família

Oleaceae

Nome Comum

freixo-florífero, freixo-de-flor, ([/glossary/278](#)) freixo-do-maná

Origem

África e Europa (região Mediterrânea, desde a Espanha até à Turquia).

Tipo de Origem

alóctone ([/glossary/116](#))

Autor

L.

Descrição

(/glossary/137)

Árvore (/glossary/137) de copa (/glossary/186) ampla, de ritidoma (/glossary/6) liso, (/glossary/345) cinzento, que pode alcançar 20 m de altura, embora habitualmente não passe dos 10 m. Ramos cinzentos, glabrescentes. Gemas ovadas, cinzentas ou quase negras, densamente cobertas de pêlo. Folhas caducas, imparipinuladas, com 5 a 9 folíolos de margem dentada, ovados ou lanceolados, com 3 a 8 cm de comprimento, que podem ter pêlo na página (/glossary/394) inferior, especialmente na base e junto às nervuras. Flores dispostas em grandes panículas terminais ou axilares, formadas cada uma por um cálice (/glossary/163) dividido em 4 lóbulos profundos, corola (/glossary/193) com 4 pétalas longas e estreitas, de cor branca, livres ou pouco unidas na base e 2 estames com longos filamentos, entre os quais situa o ovário. (/glossary/390) Fruto seco, em forma de língua, com uma aleta (/glossary/138) que facilita a disseminação (/glossary/218) (sâmara); (/glossary/478) pode medir 2 a 2,5 cm.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

sâmara (/glossary/478)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

junho

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cônica ou piramidal, isto é, mais lar base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

dentada

(provida de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Encostas montanhosas entre os 200 e os 1500 m, com clima húmido, em solos frescos, adjacentes a linhas de água, formando pequenos bosques.

Observações

O freixo de flor (/glossary/278) (*Fraxinus ornus*) tem uma floração (/glossary/280) branca ou creme muito vistosa, nascendo ao mesmo tempo que as folhas (entre Abril e Maio), de aroma muito agradável.

A denominação comum, freixo, provém do nome genérico, *Fraxinus* e esta sua vez tem origem provavelmente na palavra grega "phraxis", que significa separação, fazendo referência à facilidade com que se racha a sua madeira segundo alguns autores, ou por o freixo ter sido usado na construção de sebes, cercas ou separações de terrenos, segundo outros autores.

O nome específico do freixo-de-flor (/glossary/278) (*Fraxinus ornus*), deriva latim *orno* que significa adornar, pelas suas inflorescências decorativas em comparação com as do freixo comum; era também o nome aplicado pelos (/glossary/414) Romanos a esta árvore. (/glossary/137) Para alguns autores verdadeiro *orno* dos latinos seria o *Fraxinus excelsior* L. (freixo-europeu) e verdadeiro *Fraxinus*, o freixo-de-flor. (/glossary/278) Segundo estes, *ornus* deriva do vocábulo grego "oros" que significa montanha, aludindo ao seu

habitat (/glossary/311) natural. (/glossary/133) O freixo-de-flor (/glossary/278) (*Fraxinus ornus* L.) prefere ambientes montanhosos, de clima suave e não muito seco no Verão, os solos devem ser frescos, situando-se com frequência próximo dos cursos de água. Já o freixo Europeu (*Fraxinus excelsior* L.) está mais adaptado a ser usado como árvore (/glossary/137) ornamental, (/glossary/385) a adornar os parques e jardins.

Aplicações

No Sul da Itália e Sicília, cultiva-se o freixo de flor (/glossary/278) (*Fraxinus ornus* L.), para obtenção de maná (droga açucarada muito apreciada com efeito laxante), (/glossary/340) sendo esta obtida através de umas incisões na casca da árvore (/glossary/137) durante o Verão, pelas quais flui um líquido de sabor doce que solidifica e forma uma massa de cor amarelada. A sua acção de sequestrar as substâncias açucaradas dos caules, sendo a mais importante o maná. As folhas e a casca (/glossary/171) utilizam-se na alimentação dos animais.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

