

# *Cephalotaxus harringtonia* (Forbes) Koch

23 Exemplares no Parque



Família

Cephalotaxaceae

Nome Comum

teixo-de-hokkaido

Origem

Ásia (China e Japão).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(Forbes) Koch

## Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) ou árvore (/glossary/137) de pequeno porte (/glossary/442) que pode alcançar 10 m de altura, no entanto, frequentemente não ultrapassa a forma arbustiva. Espécie (/glossary/244) dioica, sempre-verde, (/glossary/484) resinosa. O ritidoma (/glossary/6) é escamoso (/glossary/241) de cor cinzento-avermelhada. Gemas inverniais ovóides, com 2 a 5 mm. As folhas são aciculares, verdes escuras, de textura lisa, dispostas em duas filas quase perfeitas (subdísticas), com a nervura (/glossary/370) central saliente e duas bandas estomáticas na página (/glossary/394) inferior; medem 2,5 a 6 cm de comprimento. As inflorescências masculinas são globosas, pedunculadas, inseridas na axila (/glossary/143) das folhas de ramos jovens. As inflorescências femininas são pedunculadas, constituídas por grupos de 1 a 3 flores com óvulos terminais surgem em ramos produzidos no ano. Após fecundação ocorre o desenvolvimento das sementes a partir dos óvulos. Frutos drupáceos, carnudos, ovoides, com 2,5 a 3 cm, contendo 1 a 2 sementes. Sementes duras e lenhosas, rodeadas por um tegumento (/glossary/510) carnudo, (/glossary/168) de cor verde (/glossary/484) que se torna castanho avermelhado após maturação. (/glossary/359) A maturação (/glossary/359) decorre durante um período de 2 anos.

## Tipo de Reprodução

dióica (/glossary/548)

## Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

## Ínicio de Floração

março

## Fim de Floração

abril

## Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

## Habitat

Surge no sub-bosque (/glossary/498) de florestas de zonas montanhosas.

## Observações

Multiplica-se através da semente (/glossary/482) que deve ser guardada : Primavera. Também pode ser multiplicada por estacaria, no entanto, este um sistema (/glossary/494) lento. Esta planta gosta de solos frescos e sol assim como de climas frescos. Resistente à poluição urbana.

O nome do género, *Cephalotaxus*, deriva do grego *kephale* e *taxus* que significa cabeça e teixo respectivamente, referindo-se desta forma às semelhanças entre estas plantas. O restritivo específico, *harringtonia*, res de uma dedicatória, no século XIX, ao conde de Harrington de Inglaterra.

## Aplicações

É um arbusto (/glossary/104) semelhante ao teixo, cultivado (/glossary/19 como ornamental (/glossary/385) em alguns parques e jardins da Península Ibérica.



Porte





Folha



Flor





Fruto

Tronco

