Banksia serrata L.

6 Exemplares no Parque

Família

Proteaceae

Nome Comum

cigarrilha

Origem

Oceânia (Austrália Oriental)

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

(/glossary/137)
Árvore (/glossary/137) média com 10-12 m de altura podendo chegar aos m de altura. Tronco (/glossary/524) curto, cinzento escuro. As folhas são serrilhadas, verde (/glossary/484) escura na página (/glossary/394) superi pratedas na página (/glossary/394) inferior. Folhas dispostas em verticilos 3-5, estreitamente lanceoladas. Inflorescência (/glossary/329) em espiga (/glossary/248) terminal cilíndrica, de 7-20 cm de comprimento e 5-10 cm diâmetro, com numerosas flores amarelo, creme. Os frutos estão reunidos infrutescências tipo cones, com folículos lenhosos, medem 0,7-1,5 cm de comprimento, com sementes aladas.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Ínicio de Floração

dezembro

Fim de Floração

março

Tipo de Fruto

folículo (/glossary/285)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

espiga
(inflorescência indefinida simples, com flores sésseis sobre o eixo comum (ou ráquis), mais ou menos alongado.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples
(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

verticilada
(quando no mesmo nó se inserem mais de duas folhas.)

Margem da Folha

serrilhada
(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Observações

O nome Banksia é dedicado ao Sir. Joseph Banks (1743-1820), botânico famoso, director do Kew Garden. O nome do restritivo específico, serrata, alusivo à margem das folhas serem serradas.

Aplicações

(/glossary/244)
Espécie (/glossary/244) utilizada como ornamental (/glossary/385) em par
e jardins, não sendo conhecidas outras aplicações.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco