# Prunus domestica L.

7 Exemplares no Parque



### Família

Rosaceae

Nome Comum

ameixeira, ameixoeira, ameixieira

Origem

Sudeste da Europa (Cáucaso) e sudoeste da Ásia.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

#### Descrição

A espécie (/glossary/244) *Prunus domestica* é uma árvore (/glossary/137) até 10 m de altura. As cultivares possuem os ramos subfastigiados e inerias plantas silvestres frequentemente são um tanto espinhosas, muitas ve com rebentos na raiz. Os raminhos cinzento-acastanhados, possuem folhopediceladas, oblongo-lanceoladas, (/glossary/377) densamente pubescen subglabras na página (/glossary/394) inferior. As flores possuem pétalas brancas. O fruto é uma drupa (/glossary/222) globosa a oblonga, purpúreo vermelha, amarela ou verde, (/glossary/484) doce ou ácida, não adstringe (/glossary/112) endocarpo (/glossary/232) um tanto rugoso.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

Fim de Floração

maio

março

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)
Maturação do Fruto agosto
Perenidade caducifólia
Inflorescência solitária (diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)
Cor da Flor branco
Tipo de Folha simples (Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)
Inserção de Folha alterna (quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

#### Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

#### Habitat

Rara no estado silvestre. Ocorre em terrenos abertos e solos húmidos, sel cultivada por toda a Europa.


#### Observações

É, muito provavelmente, um híbrido derivado do abrunheiro-bravo, *Prunu spinosa*, e do *Prunus cerasifera*, que crescem conjuntamente no Sudeste Europeu e na Ásia Ocidental. A ameixeira é cultivada desde tempos remo no Médio Oriente. Dela deriva o abrunheiro, *Prunus insititia*, com frutos bastante pequenos, globosos, geralmente de cor azul-escura ou púrpura.

### **Aplicações**


A "amêndoa" dos caroços da ameixeira, contém ácido cianídrico, que poc perigoso. A ameixa fresca contém 84% de água, entre 8 a 11% de glúcido 1,5% de ácidos orgânicos, uma quantidade notável de provitamina A, os minerais clássicos e um pigmento. A ameixa seca, tem uma percentagem glúcidos de cerca de 60%, dos quais 44% são açúcares, tornando-se assir alimento de elevado valor energético, tónico e depurativo e um laxante (/glossary/340) de fama milenar.

## Porte



# Folha





Fruto

# Tronco

