

Lantana camara L.

11 Exemplos no Parque



Família

Verbenaceae

Nome Comum

lantana, camará, cambará, lanatana-espinhosa, camará-miúdo, camará-verdadeiro, camará-de-espinho, (/glossary/249) camará-de-chumbo, caml de-cheiro, cambarazinho

Origem

América Tropical: América do Norte (México) e América do Sul

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

Lantana camara é um arbusto (/glossary/104) muito ramificado, sempre de 30 cm a 2(3) m ou um pouco mais de altura. Possui um aroma muito penetrante e característico, semelhante ao da erva-cidreira. (/glossary/23) Possui os ramos quadrangulares, castanho-claros, providos de pequenos espinhos. Folhas opostas, muito grossas, rugosas, ovadas ou cordiformes, margem serrada, aromáticas. Inflorescências em capítulos corimbiformes flores sésseis, pequenas, variegadas de amarelo, rosa, roxo ou alaranjada outras vezes todas amarelas, ou brancas, as externas de cor azulada. O cálice (/glossary/163) é muito pequeno, com dois lóbulos; a corola (/glossary/193) tubular, (/glossary/526) com o tubo algo curvado e limbo (/glossary/343) com 4-5 lóbulos desiguais; 4 estames, dois deles mais curtos (didinâmicos), ocultos pela corola, (/glossary/193) e ovário (/glossary/390) súpero. Os frutos são carnudos, drupáceos, com dois caroços, no início verde e no fim da maturação (/glossary/359) escuros.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Índice de Floração

julho

Fim de Floração

setembro

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

capítulo

(inflorescência indefinida, globosa ou achatada no cimo, de flores geralmente sésseis, reunidas numa dilatação do pedúnculo chamado receptáculo e rodeada, em regra, por um invólucro de brácteas que podem ser unisseriadas, bisseriadas ou imbricadas.)

Cor da Flor

vermelho

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da f

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Apresenta uma ampla tolerância ecológica, ocorrendo em diversos habitats sobre uma variedade de tipos de solos, contudo prefere zonas abertas, como as bordas de florestas tropicais e terrenos baldios.

Observações

Cultiva-se com muita frequência no Este e Sul da Península. Existem inúmeras cultivares que se diferenciam pelas tonalidades das flores. Entre elas destacam-se: 'Feston rose' com flores amarelo e rosa, a 'Mine d'or' com flores totalmente amarelas, a 'Snow white' com flores totalmente brancas, a 'Tangerine' com flores amarelo e laranja e a 'Tricolor', que apresenta flores amarelas, laranjas e rosas.

Aplicações

É considerada uma planta venenosa, sobretudo as folhas e frutos, que contém um triterpeno pentacíclico (lantanina ou lantadeno A), produzindo fotossensibilização nos animais e colapso neurocirculatório.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

