

Quercus coccinea Münchh.

59 Exemplares no Parque



Família

Fagaceae

Nome Comum

carvalho-de-scarlet, carvalho-escarlata

Origem

América do Norte e Central.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Münchh.

Descrição

O carvalho-de-scarlet é uma árvore (/glossary/137) que pode atingir 20 a m de altura. Copa (/glossary/186) ampla, frouxamente piramidal. (/glossary/433) Folhas simples, (/glossary/493) alternas, oblongas ou elípt 10 a 18 cm de comprimento, profundamente fendidas em 7 a 9 lobos larg dentados. Limbo (/glossary/343) glabro, (/glossary/299) verde-lustroso (/glossary/350) na página (/glossary/394) superior; os recortes entre os lóbulos são em forma de 'C'. Flores masculinas reunidas em amentilhos. (frutos são glandes subsésseis (1,5 a 2 cm), ovóides, com uma cúpula. (/glossary/202) A maturação (/glossary/359) é bienal.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

glande (/glossary/300)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

fendido

(dividido até cerca de meio do limbo.)

Habitat

Florestas e bosques de carvalhos, em solos arenosos, geralmente com pouca humidade.

Aplicações

(/glossary/244)

Espécie (/glossary/244) muito apreciada como ornamental, (/glossary/385) utilizada em parques e jardins pela coloração vermelho-vivo da folhagem (/glossary/282) no outono, antes de caírem as folhas.

Porte



Folha



Flor

Fruto

Tronco

