

Picea abies (L.) H.Karst.

7 Exemplares no Parque



Família

Pinaceae

Nome Comum

pícea-europeia, pícea, espruce-europeu, espruce

Origem

Europa central e setentrional. Cultiva-se com frequência na Península, ser por vezes considerada subespontânea.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(L.) H.Karst.

Descrição

(/glossary/137)

Árvore (/glossary/137) de grande altura que pode alcançar 50 a 60 m de altura, direito, de porte (/glossary/442) cónico ou subcilíndrico nos exemplares mais velhos. Ramos dispostos em verticilos, regulares, ascendentes, horizontais ou um pouco pendentes. As raízes são pouco profundas, pelo que as árvores quando isoladas e sujeitas a fortes ventos podem cair. Tronco (/glossary/524) grosso e colunar, (/glossary/179) de até 2 m de diâmetro, casca (/glossary/171) cinzenta e algo avermelhada, escamosa e com placódicas; nos exemplares mais velhos é algo gretada. (/glossary/310) Folhas aciculares, de 10-15 mm de comprimento, dispostas em espiral (/glossary/251) em torno dos caules, de secção (/glossary/481) subquadrangular, (/glossary/504) arqueadas no ápice, (/glossary/127) verde escuras, (/glossary/484) algo rígidas (/glossary/469) e pungentes, dispostas em forma radial (/glossary/455) e na base. Quando caem, deixam um pico saliente que torna os caules ásperos ao tato. Cones masculinos ovóides, com 2,5 cm, avermelhados, axilares ou terminais. Cones femininos erguidos e cilíndricos. Pinhas pendentes, cilíndricas, de 10 a 18 por 3-4 cm, com numerosas escamas seminíferas delgadas, de margem arredondada ou terminando em ponta delgada e de contorno trapezoidal, (/glossary/519) ocultam por completo as outras escamas. Sementes quase triangulares, castanho-avermelhadas, prolongadas numa asa (/glossary/138) membranácea mais larga que as sementes. As pinhas quando se abrem para deixar cair as sementes, desintegram-se.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Índice de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

pinha (/glossary/430)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

vermelho

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

radial

(dispostas radialmente ao longo do pedicelo, isto é, em vários planos.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

Habitat

Ocorre naturalmente nas florestas de coníferas (/glossary/184) das montanhas do centro e norte da Europa, entre os 400-2200 m, em solos bem drenados e pobres em matéria orgânica.

Observações

Cultivada como ornamental (/glossary/385) em parques e jardins, assim como em pequenas repovações florestais. É considerada em alguns locais uma árvore (/glossary/137) da época natalícia, sendo nessa altura muito procurada; por esse motivo tem-se intensificado o seu cultivo. Noutras partes da Europa tem sido utilizado para substituir o abeto comum.

Aplicações

Muito apreciada como ornamental; (/glossary/385) conhecem-se cerca de variedades de cultivo. A madeira é de excelente qualidade, uma das mais utilizadas depois do pinho, de cor muito clara, fácil de trabalhar e com bo acabamentos. Uma das suas principais aplicações é para obter pasta de papel, muito adequada para fabricar caixas-de-ressonância de instrument musicais de corda; com ela se construíram os famosos violinos Stradivari também utilizada na carpintaria e para construção de aviões.

Porte



Folha



Flor

Fruto



Tronco

