

Acer platanoides L.

48 Exemplares no Parque



Família

Sapindaceae

Nome Comum

ácer-da-noruega, bordo-da-noruega

Origem

Grande parte da Europa (exceto oeste), Cáucaso e oeste da Ásia (Afegani e Irão).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

O bordo-da-Noruega é uma árvore (/glossary/137) caducifólia, monoica, d a 30 m de altura, com copa (/glossary/186) oval, (/glossary/389) arredond e difusa. O tronco (/glossary/524) é bastante curto, com casca (/glossary/ lisa ou com estrias (/glossary/262) pouco salientes. As folhas são palmada com limbo (/glossary/343) de (5) 10 a 18 cm, menos profundamente loba (/glossary/346) que *Acer pseudoplatanus*, com 5 a 7 lóbulos, marginalme com dentes escassos e muito pontiagudos (/glossary/441) (acuminados). folhas são verde (/glossary/484) vivo e lustrosas em ambas as faces, tornando-se douradas ou purpuras no outono; o pecíolo (/glossary/409) é e avermelhado. As flores são reunidas em corimbo (/glossary/191) eretos, intensamente amarelo-esverdeado, aparecem antes das folhas. Cada par frutos (dissâmaras) amarelos tem asas formando um ângulo obtuso (/glossary/380) entre si.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

sâmara (/glossary/478)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da f

Limbo da Folha

palmatilobado

(com nervação palmada e limbo lobado)

Habitat

Bosques de folhas caducas, em qualquer tipo de solos, mesmo os mais pobres.

Observações

Esta espécie, (/glossary/244) embora sendo exótica, (/glossary/266) aparece em Portugal principalmente no Minho, nas margens dos cursos de água, e resiste melhor do que qualquer outro *Acer* às condições de encharcamento temporário. Por este facto e também por produzir uma madeira de boa qualidade, com inúmeras aplicações, poderá interessar a sua cultura.

Aplicações

Cultiva-se como planta ornamental (/glossary/385) em parques e jardins. sua madeira de cor branco amarelada ou avermelhada, é muito dura, sendo apreciada em carpintaria. É bastante raro na Península, encontrando-se unicamente nos Pirinéus, montanhas próximas da Catalunha, País Basco e Astúrias, onde cresce em bosques caducifólios frescos. As folhas jovens e tenras podem-se consumir cruas ou cozidas, e as sementes também são comestíveis, mas muito amargas. A seiva da árvore (/glossary/137) é açucarada, contém sacarose e sais minerais.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

