

*Acer platanoides* L.

48 Exemplares no Parque



Família

Sapindaceae

Nome Comum

ácer-da-noruega, bordo-da-noruega

Origem

Grande parte da Europa (exceto oeste), Cáucaso e oeste da Ásia (Afegani e Irão).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

## Descrição

O bordo-da-Noruega é uma árvore (/glossary/137) caducifólia, monoica, d a 30 m de altura, com copa (/glossary/186) oval, (/glossary/389) arredond e difusa. O tronco (/glossary/524) é bastante curto, com casca (/glossary/ lisa ou com estrias (/glossary/262) pouco salientes. As folhas são palmada com limbo (/glossary/343) de (5) 10 a 18 cm, menos profundamente loba (/glossary/346) que *Acer pseudoplatanus*, com 5 a 7 lóbulos, marginalme com dentes escassos e muito pontiagudos (/glossary/441) (acuminados). folhas são verde (/glossary/484) vivo e lustrosas em ambas as faces, tornando-se douradas ou purpuras no outono; o pecíolo (/glossary/409) é e avermelhado. As flores são reunidas em corimbo (/glossary/191) eretos, intensamente amarelo-esverdeado, aparecem antes das folhas. Cada par frutos (dissâmara) amarelos tem asas formando um ângulo obtuso (/glossary/380) entre si.

## Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

abril

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

sâmara (/glossary/478)

## Consistência do Fruto

seco

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

caducifólia

## Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

## Cor da Flor

amarelo

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da fo

## Limbo da Folha

palmatilobado

(com nervação palmada e limbo lobado)

## Habitat

Bosques de folhas caducas, em qualquer tipo de solos, mesmo os mais pobres.

## Observações

Esta espécie, (/glossary/244) embora sendo exótica, (/glossary/266) aparece em Portugal principalmente no Minho, nas margens dos cursos de água, e resiste melhor do que qualquer outro *Acer* às condições de encharcamento temporário. Por este facto e também por produzir uma madeira de boa qualidade, com inúmeras aplicações, poderá interessar a sua cultura.

## Aplicações

Cultiva-se como planta ornamental (/glossary/385) em parques e jardins. sua madeira de cor branco amarelada ou avermelhada, é muito dura, sendo apreciada em carpintaria. É bastante raro na Península, encontrando-se unicamente nos Pirinéus, montanhas próximas da Catalunha, País Basco e Astúrias, onde cresce em bosques caducifólios frescos. As folhas jovens e tenras podem-se consumir cruas ou cozidas, e as sementes também são comestíveis, mas muito amargas. A seiva da árvore (/glossary/137) é açucarada, contém sacarose e sais minerais.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

