

Viburnum tinus L.

1084 Exemplares no Parque



Família

Viburnaceae

Nome Comum

folhado, laurestim, folhado-comum, milfolhado

Origem

Europa (Região Mediterrânica e Macaronésia).

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) sempre-verde, (/glossary/484) raramente ultrapassando os 6 m de altura, com ramos angulosos. Possui uma folhagem (/glossary/282) muito densa, constituída por folhas simples, (/glossary/49) inteiras, curtamente pecioladas, oposto-cruzada, (/glossary/383) sem estípulas. Limbo (/glossary/343) de contorno ovado-oblongo (/glossary/37) lanceolado, (/glossary/338) com a margem inteira, de cerca de 10 cm de comprimento, verde-escuro, (/glossary/484) sendo mais claro na página (/glossary/394) inferior. As flores reunidas em cimeiras corimbiformes, bastante amplas e quase planas, até 10 cm de diâmetro, no ápice (/glossary/127) dos ramos. São hermafroditas e possuem uma corola (/glossary/193) curta, campanulada, com 5 lóbulos brancos, por vezes cor de rosa, principalmente início da floração. (/glossary/280) Apresentam 5 estames curtos, que alternam com as pétalas e um ovário (/glossary/390) estilete (/glossary/259) curto e estigma (/glossary/258) trilobulado. O fruto uma drupa, (/glossary/222) não comestível, ovoide, (/glossary/391) com 5 mm de comprimento, de cor azul metálico quando maduro, (/glossary/35) carnudo, (/glossary/168) com uma semente. (/glossary/482)

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

janeiro

Fim de Floração

março

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Ocorre naturalmente em matagais, (/glossary/358) bosques perenifólios e galerias ripícolas.

Observações

O epíteto específico, *tinus*, significa “louro silvestre”, tendo sido aplicado Plínio, e posteriormente por Clusio, pelo facto da folha (/glossary/281) ser parecida com a do loureiro. O folhado é cultivado (/glossary/198) frequentemente como ornamental, (/glossary/385) exigindo poucos cuidados. Tem flores e frutos muito duradouros, e a folhagem (/glossary/282) é sem verde (/glossary/484) e muito decorativa. Reproduz-se facilmente por semente. (/glossary/482) Existem várias cultivares, como por exemplo, a “*Strictum*” que tem porte (/glossary/442) erecto, cónico, e a “*Variiegatum*” com as folhas variegadas de amarelo ou creme e flores rosadas.

Está protegido por lei nas Baleares (relacionado com fins comerciais).

Aplicações

Os frutos do folhado já foram utilizados como purgante, e para combater hidropisia (acumulação de líquido seroso numa cavidade), contudo actualmente não é aconselhável o seu uso, pois podem provocar inflamação na boca, sendo os seus efeitos pouco conhecidos. As folhas esmagadas têm sido utilizadas como febrífugo. (/glossary/271)

Porte





Folha



Flor



Fruto



Tronco

