

Chamaecyparis obtusa (Siebold &
Zuccarini) Endlicher

8 Exemplares no Parque



Família

Cupressaceae

Nome Comum

falso-cipreste-anão, tuia-degenerada

Origem

Ásia (Japão).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(Siebold & Zuccarini) Endlicher

Descrição

O falso-cipreste-anão é uma árvore (/glossary/137) que pode atingir 30 m altura e 3 m de diâmetro. O seu tronco (/glossary/524) erecto possui casca (/glossary/171) castanha e fibrosa, fissurada. Folhas densamente imbricadas, agudas e obtusas, verde-escuras (/glossary/484) e com a margem mais esbranquiçada. Inflorescências em cones globosos, com 8 a 12 mm de diâmetro, com 8 a 10 escamas. Sementes com cerca de 3 mm de comprimento, acastanhadas.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Tipo de Fruto

pinha (/glossary/430)

Consistência do Fruto

seco

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

imbricada

(que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, como as telhas dum telhado ou escamas dos peixes, revestindo o seu conjunto uma superfície.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

agudo

(folha cujas margens confluem no ápice segundo um ângulo agudo.)

Habitat

Ocorre em florestas de coníferas ([/glossary/184](#)) ou mistas, em que as coníferas ([/glossary/184](#)) são dominantes e as angiospermas formam no estrato arbóreo, ([/glossary/131](#)) as camadas mais inferiores.

Observações

Conhecida vulgarmente no Japão por Hinoki, é cultivada nesse país pela sua madeira de alta qualidade, sendo utilizada na construção de palácios, templos, santuários, etc. O Templo Horyuji e o Castelo de Osaka foram construídos a partir de madeira Hinoki.

A madeira tem cor castanho-clara, ligeiramente rosada e aroma a limão.

Chamaecyparis obtusa pertence à família das *Cupressaceae*, assim como *Cupressus*, distinguindo-se fundamentalmente destes por terem uma folhagem (/glossary/282) menos homogénea, com ramos achatados (com folhas laterais e faciais) e gábulas ou cones mais pequenas, de maturação (/glossary/359) anual (/glossary/125) com 2 a 5 sementes por escama. (/glossary/239) Devido a esta grande semelhança com os *Cupressus* (ciprestes), são conhecidos vulgarmente por falsos-ciprestes.

Aplicações

É uma árvore (/glossary/137) ornamental (/glossary/385) popular em parques e jardins, tanto no Japão como em outros lugares em climas temperados, incluindo Europa Ocidental e partes da América do Norte. Um grande número de cultivares foram selecionadas para o plantio de jardim, incluindo formas anãs, formas com as folhas amarelas e formas com densa folhagem. (/glossary/282) Também é frequentemente cultivada como bonsai.

Porte



Folha



Flor

Fruto

Tronco

