

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray)
Parl. 'Aurea'

9 Exemplares no Parque



Família

Cupressaceae

Nome Comum

cipreste-de-lawson-de-folhas-matizadas, cedro-branco, cedro-do-oregón,
camaecipáris-do-oregón

Origem

cultivar

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(A.Murray) Parl.

Descrição

O cipreste-de-lawson é uma árvore (/glossary/137) sempre-verde, (/glossary/484) porte (/glossary/442) piramidal, (/glossary/433) de 25 a 60 m de altura. O tronco (/glossary/524) é grosso e colunar. (/glossary/179) A casca (/glossary/171) é gretada (/glossary/310) longitudinalmente, de cor escura. As folhas são escamiformes, agudas, que se alternam aos pares opostos sob raminhos achatados, de modo a formarem 4 fileiras de folhas densamente imbricadas, com o dorso provido de uma pequena glândula (/glossary/301) resinosa. Esta cultivar (/glossary/199) diferencia-se pelas suas folhas amareladas ou douradas. As ramificações de última ordem produzem-se no único plano, de modo a parecer que foram prensadas. Os cones masculinos são terminais, ovoides ou alargados, com 6 a 8 pares de escamas, cada um com 2 a 4 sacos polínicos. Cones femininos globosos, agrupados na terminação dos ramos, com 8 a 10 escamas em forma de chapéu-de-chuva, cada uma com 2 a 5 sementes avermelhadas, aladas, com duas glândulas cada lado. Os frutos são estróbilos (pinhas), possuem cerca de 0,7 a 1 cm sendo uma miniatura da pinha (/glossary/430) do cipreste comum e, por isso, muitas vezes confundida com este.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

estróbilo (/glossary/263)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

vermelho

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

imbricada

(que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, como as telhas dum telhado ou escamas dos peixes, revestindo o seu conjunto uma superfície.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

agudo

(folha cujas margens confluem no ápice segundo um ângulo agudo.)

Observações

Pertence à Família das *Cupressaceae*, assim como os *Cupressus*, distingue-se fundamentalmente destes por terem uma folhagem (/glossary/282) mais homogénea, com ramos achatados (com folhas laterais e faciais) e estróbilos mais pequenos, de maturação (/glossary/359) anual (/glossary/125) com sementes por escama. (/glossary/239) Devido a esta grande semelhança com os *Cupressus* (ciprestes), são conhecidos vulgarmente por falsos-ciprestes.

O epíteto específico, *lawsoniana*, é dedicado aos Lawson de Edimburgo, que receberam as primeiras sementes desta planta, em 1854. É uma planta excelente para cultivos florestais. Cultiva-se em parques e jardins ou para formar sebes, conhecendo-se cerca de 127 cultivares distintas. Estas variedades de cultivo diferenciam-se pelo porte, (/glossary/442) cor da folhagem, (/glossary/282) etc.

Aplicações

A madeira é branco-amarelada, fina e uniforme, aromática e elástica; trabalha-se facilmente, recebe bem o polimento e dá um bom acabamento resistindo muito bem à putrefacção, quando em contacto com o solo. É

apreciada na carpintaria de interiores e exteriores. É considerada uma planta
algo tóxica.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

