

Taxus baccata L. 'Fastigiata'

111 Exemplares no Parque



Família

Taxaceae

Nome Comum

teixo-colunar, (/glossary/179) teixo, teixo-fastigiato

Origem

Taxus baccata, é oriundo da Europa, oeste da Ásia e norte de África.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

O teixo-colunar (/glossary/179) é uma cultivar (/glossary/199) do teixo (*Taxus baccata*), com as folhas dispostas em várias filas, em espiral, (/glossary/251) mais densas e porte (/glossary/442) colunar. (/glossary/179) Arbusto (/glossary/104) de folhagem (/glossary/282) verde-escuro, (/glossary/484) persistente, (/glossary/426) Possuem o tronco (/glossary/524) com casca (/glossary/171) castanha-avermelhada escura que se desprende em tiras e placas. Folhas lineares, verde-escuras, (/glossary/484) glabras, curtamente pecioladas, alternas, dispostas em espiral (/glossary/251) o longo do ramo. Espécie (/glossary/244) dióica, (/glossary/548) exemplares masculinos produzem os cones na axila (/glossary/143) das folhas, amarelos, formados por 6 a 14 escamas polínicas que se elevam num pé, de contorno poligonal e estão protegidos inferiormente por um involúcro (/glossary/336) de brácteas alaranjadas. Nos teixos femininos as inflorescências são solitárias e nasce na axila (/glossary/143) das folhas, têm forma ovóide e estão rodeadas na base por uma bráctea (/glossary/156) verde, (/glossary/484) fazendo lembrar uma pequena bolota. Esta bráctea (/glossary/156) desenvolve-se na maturação (/glossary/359) para formar um involúcro (/glossary/336) carnoso (/glossary/168) vermelho que rodeia quase completamente a semente (/glossary/482) (arilo), (/glossary/134) vermelha quando madura, vistosa e com sabor adocicado. Frutos de maturação (/glossary/359) anual. (/glossary/179)

Tipo de Reprodução

dióica (/glossary/548)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

abril

Tipo de Fruto

pseudo-fruto

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

laranja

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

dística

(quando as folhas se dispõem em duas filas opostas, de um e outro lado de um eixo comum)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

linear

(estreita e comprida com as margens paralelas em grande extensão.)

Habitat

(/glossary/509)

Taxa (/glossary/509) obtida em viveiro a partir da espécie (/glossary/244)

Taxus baccata.

Observações

Como espécie (/glossary/244) ornamental (/glossary/385) é utilizada em parques e jardins, pelo porte (/glossary/442) que exibe e pelas formas e desenhos que pode proporcionar. No Parque de Serralves, além desta cult (/glossary/199) podemos encontrar a cultivar (/glossary/199) '*Repens*', de porte (/glossary/442) rasteiro.

Aplicações

Tal como o *Taxus baccata*, esta cultivar (/glossary/199) é uma planta muito tóxica exceto o arilo (/glossary/134) carnudo (/glossary/168) que serve de alimento às aves que a disseminam (pombo torcaz).

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

