

*Frangula alnus* Mill.

93 Exemplares no Parque



Família

Rhamnaceae

Nome Comum

sanguinho-de-água, amieiro-negro, frângula, sanguinho-das-ribeiras, zangarinho, sangarinheiro, fúsaro, lagarinho

Origem

Grande parte Europa, noroeste de África e Ásia (Próximo Oriente).

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

Mill.

## Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) caducifólia, geralmente com uma altura de 4 ou 5 m, Ramagem (/glossary/457) pouco densa, por vezes ligeiramente avermelhada. Tronco (/glossary/524) ereto, (/glossary/236) com casca (/glossary/171) cinzento-acastanhada. Folhas simples, (/glossary/493) pecioladas, dispostas alternadamente, com forma elíptica ou obovadas, inteiras, frequentemente com 7-9 pares de nervuras laterais, quase paralelas. Pecíolos avermelhados, apresenta pequenas estípulas caducas, nas folhas jovens. Flores hermafroditas, constituídas por pétalas e 5 sépalas (pentâmeras), solitárias ou em pequenos grupos, dispostas em cimeiras nas axilas das folhas, com cálice (/glossary/163) e corola (/glossary/193) muito pequenos, de cor verde (/glossary/484) ou amarelada. O fruto é uma drupa, (/glossary/222) com 6-10 mm de diâmetro inicialmente verde, (/glossary/484) tornando-se negra na maturação, (/glossary/359) com 2-3 sementes obovadas.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

março

## Fim de Floração

julho

## Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

agosto

## Perenidade

caducifólia

## Inflorescência

cimeira

( inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

## Cor da Flor

amarelo

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

## Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para extremos.)

## Habitat

(/glossary/244)

Espécie (/glossary/244) autóctone (/glossary/142) em Portugal continenta habita em locais húmidos na periferia de cursos de água ou em vales, mu vezes no sob coberto de bosques sombrios, desde o nível do mar até serr de baixa altitude.

## Observações

O nome do género *Frangula*, deriva da palavra latina *frangere*, que signifi romper, quebrar ou partir, alusivo à fragilidade dos ramos e madeira dest espécie. (/glossary/244) Embora seja nativa em Portugal, o sanguinho-de-é uma espécie (/glossary/244) invasora (/glossary/335) na América do No

## Aplicações

Planta muito apreciada em parques e jardins principalmente por atrair vários insetos e passeriformes. A casca (/glossary/171) de *Frangula alnus*, depois seca durante um ano, reduzida a pó e peneirada, apresenta propriedades laxantes, contudo é considerada algo tóxica, especialmente as folhas e os frutos. Estes podem ser utilizados em tinturaria. Outrora a sua madeira era aproveitada na produção de carvão para o fabrico de pólvora.

## Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

