

Ilex aquifolium L. 'Variegata'

3 Exemplares no Parque



Família

Aquifoliaceae

Nome Comum

azevinho-de-folhas-variegadas, zebra, pica-folha, (/glossary/281) visqueiro

Origem

Sul e oeste da Europa, norte de África e oeste da Ásia. Na Península Ibérica especialmente abundante nas regiões setentrionais.

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

(/glossary/244)

Espécie (/glossary/244) sempre-verde, (/glossary/484) dioica, que possui porte (/glossary/442) arbustivo (/glossary/132) ou arbóreo, (/glossary/131 podendo atingir 20 m de altura. Tronco (/glossary/524) direito com casca (/glossary/171) lisa e cinzenta, tornando-se rugosa com a idade. Folhas simples, (/glossary/493) alternas, lanceoladas ou ovado-oblongas, (/glossary/388) coriáceas e lustrosas na página (/glossary/394) superior, onduladas e de margem espinhosa, por vezes praticamente lisa. Esta culta (/glossary/199) apresenta folhas bicolores ou variegadas, geralmente vermelha (/glossary/484) e branco ou verde (/glossary/484) e creme. As flores são pequenas, até 1 cm de diâmetro, brancas, funcionalmente unisexuais e surgem em pequenos cachos na zona de inserção (/glossary/331) das folhas. O fruto é uma drupa (/glossary/222) carnuda, esférica até 1 cm de diâmetro com 4 a 5 sementes, muito atrativo pela sua cor vermelho-vivo.

Tipo de Reprodução

dioica (/glossary/548)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

julho

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

espinhosa

(margem provida de espinhos.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

A espécie (/glossary/244) nativa *Ilex aquifolium*, ocorre espontaneamente bosques e matagais (/glossary/358) húmidos, carvalhais e nas margens d água, bem como em encostas montanhosas ensombradas da sua área (/glossary/133) de distribuição, até 1600 m.

Observações

O azevinho, está protegido por Decreto-Lei nº 423/89, de 4 de Dezembro, proíbe a colheita dos seus ramos e o corte na meio Natural, (/glossary/131 que levou a que fosse propagado e manipulado em viveiro para satisfazer sua grande procura como planta ornamental. (/glossary/385)

Aplicações

É uma das espécies mais cultivada como ornamental (/glossary/385) em parques e jardins pela sua beleza e resistência à poluição. Possui uma madeira dura, difícil de trabalhar, contudo apreciada para trabalhos de marcenaria. Como planta medicinal, às folhas são atribuídas propriedades diuréticas e os frutos, que são tóxicos, são purgantes e provocam o vômito.

Porte

Folha



Flor

Fruto

Tronco

