

Juniperus communis L.

273 Exemplares no Parque



Família

Cupressaceae

Nome Comum

zimbro, zimbreiro

Origem

Europa, Ásia e América do Norte

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

(/glossary/104)

Arbusto (/glossary/104) ou árvore (/glossary/137) dioica, perenifólia, resinosa de até 10 m de altura, ereto, (/glossary/236) por vezes com casca (/glossary/171) castanho-avermelhada, destacando-se em placas papiráceas. Folhas reunidas em 3 por nó, simples (/glossary/493) e aciculares (até 1 cm) pungentes com uma faixa estomática esbranquiçada na página (/glossary/394) superior. As gálbulas (fruto), são cinzentas quando surgem ficando castanhas na maturação. (/glossary/359) As estruturas masculinas formadas por 3 ou mais sacos polínicos na face inferior de uma pequena escama (/glossary/239) e as femininas resultando numa gálbula (/glossary/292) globosa, carnuda e negro-azulada (fruto).

Tipo de Reprodução

dióica (/glossary/548)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

junho

Fim de Floração

agosto

Tipo de Fruto

gálbula (/glossary/292)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

Inserção de Folha

verticilada

(quando no mesmo nó se inserem mais de duas folhas.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Habitat

Ocorre principalmente em regiões montanhosas da sua área (/glossary/13) de distribuição.

Observações

O género *Juniperus* compreende cerca de 50 espécies de arbustos ou mais raramente pequenas árvores de folha (/glossary/281) persistente (/glossary/426) habitando todas o hemisfério Norte. Distinguem-se facilmente das outras Coníferas (/glossary/184) pelos (/glossary/414) seus frutos, que são pequenos cones constituídos por escamas carnudas e unidas entre si, formando pequenas bolas, gábulas, maduras somente no segundo ano, ficando então com o aspeto de bagas de um negro azulado. As folhas são também muito singulares. São as únicas Coníferas (/glossary/184) que, quando adultas, têm ora folhas aciculares (agulhas), ora escamiformes (escamas), ora ambas simultaneamente, enquanto que a sua folhagem (/glossary/282) juvenil é exclusivamente acicular. (/glossary/107)

Aplicações

As plantas deste género são utilizadas para os mais diversos fins desde a antiguidade. De facto, os frutos de *Juniperus communis* eram utilizados na antiguidade para produzir o chamado vinho de zimbro que deu origem à zimbrada designada internacionalmente por genebra ou 'gin'. São ainda utilizadas para temperar carnes ou mesmo para adicionar um travo peculiar a certas bebidas alcoólicas.

Porte



Folha



Flor

Fruto

Tronco

