

*Pyrus communis* L. subsp. *pyraster*

74 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

pereira-brava

Origem

Cáucaso e este da Europa.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

## Descrição

A pereira brava é uma árvore (/glossary/137) de folha (/glossary/281) caducifolia, com altura até 12 m. Casca (/glossary/171) cinzenta-acastanhada, lisa quando jovem e reticulada a fendida mais tarde, com robustos espinhos nas extremidades dos ramos. Folhas orbiculares a ovadas com pecíolo (/glossary/409) fino e mais comprido que o comprimento da folha, (/glossary/281) ápice (/glossary/127) agudo (/glossary/114) e frequentemente truncadas na base. Margem crenulada ou finamente serrilhada, quase inteira. Flores reunidas em corimbos na extremidade dos ramos, tomentosos na base e glabros na frutificação. (/glossary/289) Flores brancas com corola (/glossary/289) de 2,5 cm de diâmetro. Fruto é um pomo, (/glossary/440) globoso (/glossary/305) a turbinado, geralmente coroado pelo cálice (/glossary/16) marcescente, (/glossary/356) pardo (/glossary/405) e com pedúnculo (/glossary/413) grosso e rígido

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

abril

## Fim de Floração

junho

## Tipo de Fruto

pomo (/glossary/440)

## Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

## Maturação do Fruto

julho

## Perenidade

caducifólia

## Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

## Cor da Flor

branco

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

crenada

(provida de corte arredondados na margem)

## Limbo da Folha

orbicular

(ou arredondada, de contorno arredondado, circular, com razão comprimento/largura igual à unidade.)

## Habitat

Sebes, bosques e matas luminosos.

## Observações

*Pyrus communis* reúne um variado grupo de formas diferenciadas essencialmente pelas formas de cultura, com melhor sabor do fruto (pera mais doce (*P. communis*; *P. communis* var. *sativa*) e pelas formas selvagens com peras mais ásperas, pequenas e de sabor acre (*P. communis* subsp. *pyraster*). Nem todos os autores aceitam a subsp. *pyraster* como válida. Seguimos os autores que aceitam esta subespécie, porque em Serralves existem dois tipos muito distintos de *Pyrus communis*, sendo que a subsp. *pyraster* possui folha (/glossary/281) mais arredondadas com pecíolos muito compridos e fruto de menores dimensões.

## Aplicações

Os seus frutos, as peras são nitidamente mais pequenas que as das formas cultivares, de cor amarelo a vermelho e comestíveis, mas muito duras e ácidas.

Porte





Folha



Flor



Fruto





Tronco

