

Pyrus communis L. subsp. *pyraster*

74 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

pereira-brava

Origem

Cáucaso e este da Europa.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

A pereira brava é uma árvore (/glossary/137) de folha (/glossary/281) cadu- até 12 m de altura. Casca (/glossary/171) cinzenta-acastanhada, lisa quando jovem e reticulada a fendida mais tarde, com robustos espinhos nas extremidades dos ramos. Folhas orbiculares a ovadas com pecíolo (/glossary/409) fino e mais comprido que o comprimento da folha, (/glossary/281) ápice (/glossary/127) agudo (/glossary/114) e frequentemente truncadas na base. Margem crenulada ou finamente serrilhada, quase inteira. Flores reunidas em corimbos na extremidade dos ramos, tomentosos na rebentação e glabros na frutificação. (/glossary/289) Flores brancas com corola de 2,5 cm de diâmetro. Fruto é um pomo, (/glossary/440) globoso (/glossary/305) a turbinado, geralmente coroado pelo cálice (/glossary/16) marcescente, (/glossary/356) pardo (/glossary/405) e com pedúnculo (/glossary/413) grosso e rígido

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

pomo (/glossary/440)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

julho

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

crenada

(provida de corte arredondados na margem)

Limbo da Folha

orbicular

(ou arredondada, de contorno arredondado, circular, com razão comprimento/largura igual à unidade.)

Habitat

Sebes, bosques e matas luminosos.

Observações

Pyrus communis reúne um variado grupo de formas diferenciadas essencialmente pelas formas de cultura, com melhor sabor do fruto (pera mais doce (*P. communis*; *P. communis* var. *sativa*) e pelas formas selvagens com peras mais ásperas, pequenas e de sabor acre (*P. communis* subsp. *pyraster*). Nem todos os autores aceitam a subsp. *pyraster* como válida. Seguimos os autores que aceitam esta subespécie, porque em Serralves existem dois tipos muito distintos de *Pyrus communis*, sendo que a subsp. *pyraster* possui folha (/glossary/281) mais arredondadas com pecíolos muito compridos e fruto de menores dimensões.


Aplicações

Os seus frutos, as peras são nitidamente mais pequenas que as das formas cultivares, de cor amarelo a vermelho e comestíveis, mas muito duras e ácidas.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

