

Quercus rotundifolia Lam.

150 Exemplares no Parque



Família

Fagaceae

Nome Comum

azinheira, azinho, sardão, sardoeira, carrasco (nordeste de Portugal)

Origem

Europa: região Mediterrânica.

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

Lam.

Descrição

A azinheira é uma árvore (/glossary/137) perenifólia, de crescimento lento que pode atingir os 25 m de altura, normalmente entre 8 a 12 m, com casca (/glossary/171) cinzenta, fendida em pequenas placas retangulares e copa (/glossary/186) ampla e arredondada. O seu tronco (/glossary/524) é direito por vezes um pouco torcido. As folhas são simples, (/glossary/493) alternas, oblongas ou elípticas, de margem inteira ou providas de um número variado de dentes, especialmente as dos ramos inferiores. A coloração das folhas verde-acinzentadas (/glossary/484) ou cinzentas na página (/glossary/394) superior e cinzento-esbranquiçadas com uma densa camada de pelos (/glossary/414) estrelados branco-amarelados na página (/glossary/394) inferior. As dimensões das folhas podem ser de 2 a 7 cm e a sua forma pode variar no mesmo exemplar. As flores masculinas (amentilhos) são abundantes na parte terminal dos ramos. O fruto é uma bolota, com uma glande (/glossary/300) ovoide (/glossary/391) com pedúnculo (/glossary/414) curto e uma cúpula (/glossary/202) hemisférica (/glossary/314) em forma de dedal, com escamas quase planas.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Índice de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

glande (/glossary/300)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

oblongo

(contorno elíptico, mas muito alongada, de forma a que os lados são quase paralelos.)

Habitat

Bosques esclerófilos mediterrânicos, em todo o tipo de substrato. Adaptado para suportar fortes secas estivais e climas duros continentais. Montados.

Observações

A azinheira é uma espécie (/glossary/244) muito variável, com inúmeras cultivares disponíveis. Árvore (/glossary/137) característica e importante dos bosques esclerófilos mediterrânicos, que constituem a vegetação potencial na maior parte da Península Ibérica. No seu habitat (/glossary/311) natural (/glossary/133) ocorre entre os 0 e 1400 m, podendo chegar aos 2000. Espécie (/glossary/244) de luz ou meia sombra, que resiste bem às baixas temperaturas mínimas absolutas da Península Ibérica e à exposição marítima. A azinheira é uma espécie (/glossary/244) que pode ultrapassar os 300 ar e podendo chegar excepcionalmente aos 1000. Em termos de nomenclatura científica há vários sinónimos: *Quercus rotundifolia* Lam., *Q. ballota* Desf., *Ilex* L. subsp. *rotundifolia* (Desf.) O. Schwarz ex Tab. de Morais.

Aplicações

Esta é uma espécie (/glossary/244) bastante resistente sendo, por isso, m procurada como árvore (/glossary/137) ornamental. (/glossary/385) Desempenha um papel muito importante no sistema (/glossary/494) de agricultura de montado, como produtora de bolota para porcos de montanha. É também utilizada para carvão, madeira e lenha.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

