

Rhamnus alaternus L.

19 Exemplares no Parque



Família

Rhamnaceae

Nome Comum

sanguinho-das-sebes, aderno-bastardo, aderno, aderno-bravo, espinheiro cerval, samoca

Origem

Europa, África e Ásia: Região Mediterrânica.

Tipo de Origem

autóctone (/glossary/142)

Autor

L.

Descrição

O sanguinho-das-sebes é um arbusto (/glossary/104) ou pequena árvore (/glossary/137) perenifólio (/glossary/423) que pode atingir 5 m de altura, numerosos ramos. As suas folhas são simples, (/glossary/493) alternas, de margens mais ou menos serrilhada, glabras, verde-escuras (/glossary/484) página (/glossary/394) superior e verde (/glossary/484) mais claro na inferior de forma muito variada, desde lanceolada a ovada ou elíptica. As flores são agrupadas em cachos densos, com pedicelos curtos. Esta é uma espécie (/glossary/244) dioica, logo as flores femininas e masculinas estão em exemplares distintos. As flores masculinas são abertas em forma de estrela e as femininas eretas e desenvolvem-se na axila (/glossary/143) das folhas. As flores são pentâmeras e o fruto é uma drupa (/glossary/222) negra ou vermelha consoante o grau de maturação. (/glossary/359)

Tipo de Reprodução

dióica (/glossary/548)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ; longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho composto.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alternata

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para extremos.)

Habitat

(/glossary/358)

Matagais (/glossary/358) e bosques de folhas persistentes e marcescentes em orlas e clareiras de carvalhais, fissuras das rochas.

Observações

O restritivo específico, do latim, *alaternus*, semelhante a *alternus*, numa referência às suas folhas alternas. São plantas muito resistentes à seca e de crescimento relativamente rápido. Naturalizada na Austrália e Nova Zelândia, é utilizada em campanhas de reflorestação. Em Portugal ocorre praticamente em todo o território, com predomínio no centro e sul.

Aplicações

As flores do sanguinho-das-sebes são usadas na confecção de preparados farmacêuticos para reduzir a tensão arterial. O ritidoma (/glossary/6) adstringente (/glossary/112) era utilizado em colutórios. A sua madeira foi utilizada no fabrico de pentes. Como ornamental (/glossary/385) é apreciada para formar sebes e topiária fortemente podada.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

