

Taxus baccata L. 'Repens'

44 Exemplares no Parque



Família

Taxaceae

Nome Comum

teixo-rasteiro, teixo-de-porte-rasteiro ([/glossary/442](#))

Origem

A espécie nativa, *Taxus baccata*, é oriunda da Europa, oeste da Ásia e noroeste da África.

Tipo de Origem

alóctone ([/glossary/116](#))

Autor

L.

Descrição

Esta cultivar (/glossary/199) obtida a partir da espécie (/glossary/244) *Tax baccata*, distingue-se pelo porte (/glossary/442) rasteiro. É um arbusto (/glossary/104) de folhagem (/glossary/282) verde-escuro (/glossary/484) persistente. (/glossary/426) Possui o tronco (/glossary/524) grosso, com casca (/glossary/171) castanha-avermelhada escura que se desprende em tiras finas. Produz grande número de ramos estendidos e quase horizontais. As folhas são lineares, verde-escuras, (/glossary/484) glabras, curtamente pecioladas, alternas, dispostas num plano (dísticas), por torção do pecíolo (/glossary/409) com a nervura (/glossary/370) média algo saliente na face inferior e que termina num pequeno mucrão. (/glossary/363) É uma espécie (/glossary/244) dioica, os exemplares masculinos produzem os cones na axila (/glossary/143) das folhas, amarelos, formados por 6 a 14 escamas polínias que se elevam num pé, de contorno poligonal; estão protegidos inferiormente por um invólucro (/glossary/336) de brácteas alaranjadas. Nos teixos femininos as inflorescências são solitárias e nascem na axila (/glossary/143) das folhas, têm forma ovoide (/glossary/391) e estão rodeadas na base por uma bráctea (/glossary/156) verde, (/glossary/484) fazendo lembrar uma pequena bolota. Esta bráctea (/glossary/156) desenvolve-se na maturação (/glossary/359) para formar um invólucro (/glossary/336) carnudo (/glossary/168) vermelho que rodeia quase completamente a semente (/glossary/482) (arilo), (/glossary/134) vermelha quando madura, vistosa e adocicada, mas tóxica. Os frutos têm uma maturação (/glossary/359) anual (/glossary/125)

Tipo de Reprodução

dioica (/glossary/548)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

abril

Tipo de Fruto

pseudo-fruto

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

laranja

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

dística

(quando as folhas se dispõe em duas filas opostas, de um e outro lado de um eixo comum)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

linear

(estreita e comprida com as margens paralelas em grande extensão.)

Habitat

(/glossary/509)

Taxa (/glossary/509) obtida em viveiro a partir da espécie (/glossary/244) *Taxus baccata*.

Observações

Como espécie (/glossary/244) ornamental (/glossary/385) é utilizada em parques e jardins, pelo porte (/glossary/442) que exibe e pelas formas e desenhos que pode proporcionar. No Parque de Serralves, além desta cult (/glossary/199) podemos encontrar a cultivar (/glossary/199) ‘Fastigiata’, as folhas dispostas em espiral (/glossary/251) ao longo dos ramos e porte (/glossary/442) colunar. (/glossary/179)

Aplicações

Tal como o *Taxus baccata*, esta cultivar (/glossary/199) é uma planta muit tóxica exceto o arilo (/glossary/134) carnudo (/glossary/168) que serve de alimento às aves que a disseminam (como o pombo torcaz).

Porte



Folha



Flor

Fruto

Tronco

