

Howea forsteriana (F.Muell.) Becc.

13 Exemplares no Parque



Família

Areceaceae

Nome Comum

palmeira-kentia, quência, kentia, palmeira-do paraíso, palmeira-de-interior

Origem

Endêmica da Ilha Lord Howe (Oceânia)

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(F.Muell.) Becc.

Descrição

O espique da palmeira-kentia pode atingir 20 metros de altura, sendo muito dilatado na base e possuindo anéis bem marcados, que são cicatrizes resultantes da queda das folhas. As folhas são pinadas, podem atingir cerca de 3 metros de comprimento, com longos folíolos lineares e pendentes, verde-escuros (/glossary/484) na página (/glossary/394) superior e verde (/glossary/484) mais claro na página (/glossary/394) inferior.

As inflorescências são panículas com cerca de 1 metro de comprimento. As flores são brancas dispostas em tríades (2 masculinas e 1 feminina). Possuem numerosos estames. Os frutos são drupas, elipsoides, com cerca de 1,5 cm de comprimento, inicialmente verdes e alaranjados e gradualmente adquirem a cor vermelho-escuro quando maduros.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

agosto

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cônica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

pinulado

(folha composta, com os folíolos articulados ao longo de um eixo comum ou ráquis.)

Habitat

Cresce em clima subtropical, em colónias extensas abaixo dos 875 metros de altitude.

Observações

Embora endémica da Ilha de Lord Howe, a palmeira-kentia tornou-se cosmopolita, por ser muito tolerante a diversos climas, adaptando-se tanto a interiores com pouca luminosidade. A sua manutenção não requer grandes cuidados e o seu crescimento é bastante lento o que favorece a sua aptidão como planta de interiores. É resistente à salinidade das zonas litorais, mas deve ser protegida dos ventos fortes que podem danificar as suas folhas. Multiplica-se por sementes que devem ser colhidas de frutos totalmente maduros, o que pode levar 3 a 4 anos, e plantados imediatamente. A germinação é muito irregular (/glossary/337) e pode levar 2 meses a 3 anos a ocorrer. A quebra da dormência em água quente melhora as taxas de germinação.

Aplicações

A palmeira-kentia é muito utilizada como ornamental, (/glossary/385) valorizando projetos paisagísticos e de decoração. É uma das palmeiras não utilizadas em interiores.

Porte



Folha



Flor

Fruto

Tronco

