

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb
'Ferraduel'

4 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

amendoira, amendoira-doce (var. *dulcis*), amendoira-amarga (var. amêndoa-de-coco, amêndoa-durázio e amêndoa-molar

Origem

Europa (Balcãs), sudoeste da Ásia e norte de África.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

(Mill.) D. A. Webb

Descrição

A amendoeira é uma pequena árvore (/glossary/137) com 8 (10) m de altura, caducifólia, muito ramificada, (/glossary/458) com ramificação ascendente (/glossary/139). Apresenta um ritidoma (/glossary/6) de cor negro-purpúrea com gretas profundas. Os ramos enquanto jovens são verdes. As folhas têm 10 (12) x 1,2 a 3 (4) cm, podem ser ovadas, oblongo-lanceoladas (/glossary/377) ou elípticas, são acuminadas, de margens crenadas ou serradas, glabras e verdes em ambas as páginas. Pecíolo (/glossary/409) 1,2 a 2,5 (3) cm, glabro. (/glossary/299) Estípulas caducas, linear-lanceoladas (/glossary/344) dentado-laciñadas. (/glossary/207) As flores são solitárias geminadas, precoces, subsésseis, rodeadas na base por numerosas brácteas pedicelos (/glossary/410) glabros (/glossary/299) com 0,2 a 0,5 (a,7) mm. A sépala com 4 a 6 mm são eretas ou reflexas, triangular-lanceoladas ou ovado-oblongas, (/glossary/388) inteiras, obtusas ou subagudas, de margem tomentosa, avermelhada. As pétalas com 15 a 20 mm, são patentes ou empatadas, (/glossary/236) obovadas ou suborbiculares, de cor rosa pálido-brancas. Ovário (/glossary/390) pubescente. (/glossary/448) O fruto é uma drupa (/glossary/222) com 30 a 45 (50) mm, ovoide (/glossary/391) ou ovado-oblongo, (/glossary/377) atenuado no ápice, (/glossary/127) comprimido lateralmente, verde-acinzentado, (/glossary/484) aveludado. A parte carnosa da drupa (/glossary/222) é o mesocarpo. O endocarpo (/glossary/232) é a parte mais interna é rijo e protege uma semente (/glossary/482) comestível no caso da amendoeira.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

fevereiro

Fim de Floração

março

Tipo de Fruto

drupa ([/glossary/222](#))

Consistência do Fruto

carnudo ([/glossary/168](#))

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

crenada

(provida de corte arredondados na margem)

Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

Habitat

Colinas, encostas, bordas de caminhos, taludes, terrenos rochosos, campos cultivo e limites de campos cultivados. Preferencialmente em solos calcários soltos e profundos.

Observações

A amendoeira, como cultivada ou naturalizada ocorre em toda a região (/glossary/462) Mediterrâника até ao Centro da Europa e em outros pontos Terra. Na Península Ibérica é cultivada em quase todo o território, exceto zonas frias e de clima mais húmido, mas com mais incidência no este e só na Baleares; com frequência se encontra naturalizada. A produção de amêndoas reparte-se essencialmente por três continentes: a América (45%), Europa (23%) e a Ásia (21%).

A cultivar (/glossary/199) de origem francesa 'Ferraduel', possui floração (/glossary/280) tardia, em março, produz amêndoas doces, amplas e achatadas com casca (/glossary/171) dura.

Aplicações

As amêndoas são utilizadas para fins culinários e terapêuticos. Das amêndoas extraídos óleos e essências com propriedades medicinais e muito utilizados na indústria cosmética e na produção do licor Amaretto.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco