

*Camellia japonica* L. 'Takanini'

1 Exemplos no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

cameleira, japoneira, roseira-do-japão, camélia

Origem

Originária da Nova Zelândia

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

## Descrição

A cameleira é um arbusto ou árvore sempreverde, (/glossary/137) podendo alcançar uma altura até 15 m, com copa arredondada, (/glossary/186) muito ramosa e tronco liso, sem (/glossary/345) espinhos, castanho ou verde escuro. Apresenta (/glossary/484) folhas simples, alternas, (/glossary/493) ovadas ou elípticas, com 4 a 10 cm de comprimento, ápice agudo, de (/glossary/114) margem finamente serrada, muito coriáceas e curtamente pecíoladas. Flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, dispostas na parte terminal dos ramos, com dimensões muito variáveis, dependendo das variedades, entre 3 a 12 cm de diâmetro. Possuem grande variabilidade na estrutura floral, apresentando um cálice caduco, formado (/glossary/163) por 5 ou 6 sépalas imbricadas e algumas brácteas, corola com (/glossary/193) 5 ou 6, numerosas pétalas, de forma ovada ou arredondada, com uma quase infinidade de cores e matizes, que podem ir do branco ao roxo, passando por muitos tons de rosa. Os estames são em número variável, mais ou menos unidos na base. O fruto é uma cápsula globosa, (/glossary/166) de 4 a 5 cm de diâmetro, que se abre por 3 a 5 valvas, com sementes grandes e arredondadas.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

fevereiro

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

## Consistência do Fruto

seco

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

## Cor da Flor

vermelho

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da f

## Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## Observações

A *C.japonica* 'Takanini' é uma variedade de camélia, originária da Nova Zelândia, tendo sido descrita pela primeira vez em 1984. As flores, de tamanho pequeno a médio, isto é, até 8 cm de diâmetro, são de cor vermelho escuro muito vivo, principal característica desta variedade. São formadas uma ou mais camadas de grandes pétalas exteriormente e um conjunto de pétalas mais pequenas ao centro. Apresenta porte (/glossary/442) ereto (/glossary/236) e geralmente é de rápido crescimento. Floresce do início ao fim da estação.

O género *Camellia* L. é dedicado à memória de Georg Joseph Kámel (1661-1706), um jesuíta da Moravia, botânico e zoólogo, que viajou pela Ásia no século XVII e trouxe para a Europa a camélia.

## Aplicações

Muito usada como ornamental, sendo (/glossary/385) fácil encontrá-la em muitos jardins privados e parques públicos. Das sementes extraí-se um óleo (tsubaki), utilizado no Japão, como amaciador ou também usado em massagens para a pele.

Porte



Folha

Flor



Fruto

Tronco