

Camellia japonica L. 'Kona Benten'

1 Exemplares no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

cameleira, japoneira, roseira-do-japão, camélia

Origem

Originária da Nova Zelândia

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

A cameleira é um arbusto ou árvore sempreverde, (/glossary/137) podendo alcançar uma altura até 15 m, com copa arredondada, (/glossary/186) muito ramosa e tronco liso, sem (/glossary/345) espinhos, castanho ou verde escuro. Apresenta (/glossary/484) folhas simples, alternas, (/glossary/493) ovadas ou elípticas, com 4 a 10 cm de comprimento, ápice agudo, de (/glossary/114) margem finamente serrada, muito coriáceas e curtamente pecíoladas. Flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, dispostas na parte terminal dos ramos, com dimensões muito variáveis, dependendo das variedades, entre 3 a 12 cm de diâmetro. Possuem grande variabilidade na estrutura floral, apresentando um cálice caduco, formado (/glossary/163) por 5 ou 6 sépalas imbricadas e algumas brácteas, corola com (/glossary/193) 5 ou 6, numerosas pétalas, de forma ovada ou arredondada, com uma quase infinidade de cores e matizes, que podem ir do branco ao roxo, passando por muitos tons de rosa. Os estames são em número variável, mais ou menos unidos na base. O fruto é uma cápsula globosa, (/glossary/166) de 4 a 5 cm de diâmetro, que se abre por 3 a 5 valvas, com sementes grandes e arredondadas.

Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

fevereiro

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Observações

Esta variedade de camélia, a *C.japonica* 'Kona Benten', originária da Nova Zelândia, foi observada pela primeira vez em 1985. Apresenta flores, geralmente de cor branca, formadas por uma ou mais camadas de grandes pétalas exteriores, cerca de 12, e uma densa camada de pétalas mais pequenas, ocasionalmente tingidas de verde, (/glossary/484) na zona central. As folhas distinguem-se facilmente de outras espécies de camélias, sendo marginadas de um verde (/glossary/484) mais claro e de formato irregular (/glossary/337) A floração (/glossary/280) é geralmente tardia.

O género *Camellia* L. é dedicado à memória de Georg Joseph Kámel (1661-1706), um jesuíta da Moravia, botânico e zoólogo, que viajou pela Ásia no século XVII e trouxe para a Europa a camélia.

Aplicações

Muito usada como ornamental, sendo (/glossary/385) fácil encontrá-la em muitos jardins privados e parques públicos. Das sementes extraí-se um óleo (tsubaki), utilizado no Japão, como amaciador ou também usado em

massagens para a pele.

Porte

Folha



Flor

Fruto

Tronco