

*Camellia japonica* L. 'Bob's Tinsie'

1 Exemplares no Parque



Família

Theaceae

Nome Comum

cameleira, japoneira, roseira-do-japão, camélia

Origem

Originária dos Estados Unidos da América

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

## Descrição

A cameleira é um arbusto ou árvore sempreverde, (/glossary/137) podendo alcançar uma altura até 15 m, com copa arredondada, (/glossary/186) muito ramosa e tronco liso, sem (/glossary/345) espinhos, castanho ou verde escuro. Apresenta (/glossary/484) folhas simples, alternas, (/glossary/493) ovadas ou elípticas, com 4 a 10 cm de comprimento, ápice agudo, de (/glossary/114) margem finamente serrada, muito coriáceas e curtamente pecíoladas. Flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, dispostas na parte terminal dos ramos, com dimensões muito variáveis, dependendo das variedades, entre 3 a 12 cm de diâmetro. Possuem grande variabilidade na estrutura floral, apresentando um cálice caduco, formado (/glossary/163) por 5 ou 6 sépalas imbricadas e algumas brácteas, corola com (/glossary/193) 5 ou 6, numerosas pétalas, de forma ovada ou arredondada, com uma quase infinidade de cores e matizes, que podem ir do branco ao roxo, passando por muitos tons de rosa. Os estames são em número variável, mais ou menos unidos na base. O fruto é uma cápsula globosa, (/glossary/166) de 4 a 5 cm de diâmetro, que se abre por 3 a 5 valvas, com sementes grandes e arredondadas.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita (/glossary/315)

## Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

## Ínicio de Floração

fevereiro

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

cápsula (/glossary/166)

## Consistência do Fruto

seco

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

## Cor da Flor

vermelho

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da f

## Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## Observações

A variedade cultivada *C.japonica* 'Bob's Tinsie', originária dos EUA, foi documentada pela primeira vez em 1962.

Caracteriza-se por apresentar flores de pequenas dimensões, não ultrapassando 6 cm de diâmetro, de cor vermelha brilhante, com uma ou camadas de pétalas exteriores de grandes dimensões e um conjunto de: pétalas tingidas de branco, muito pequenas, na zona central, marcadame visíveis.

Para além da sua presença no Parque de Serralves, esta variedade também pode ser avistada no Jardim Terra Nostra, em São Miguel (Açores).

O género *Camellia* L. é dedicado à memória de Georg Joseph Kámel (1661-1706), um jesuíta da Moravia, botânico e zoólogo, que viajou pela / no século XVII e trouxe para a Europa a camélia.

## Aplicações

Muito usada como ornamental, sendo (/glossary/385) fácil encontrá-la em muitos jardins privados e parques públicos. Das sementes extraí-se um ól (tsubaki), utilizado no Japão, como amaciador ou também usado em massagens para a pele.

Porte

Folha

Flor

Fruto

Tronco