

Viburnum trilobum Marshall

5 Exemplares no Parque



Família

Viburnaceae

Nome Comum

viburno

Origem

Desde o Canadá até ao Norte dos E.U.A.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

Marshall

Descrição

O *V. trilobum* apresenta porte (/glossary/442) arbustivo (/glossary/132) e folhagem (/glossary/282) é caducifólia, podendo atingir 4 metros de altura formado por uma casca (/glossary/171) acinzentada, de textura escamosa tendencialmente rugosa. Os seus ramos são arqueados e densos.

As folhas, de cor verde, (/glossary/484) entre 6 a 12 cm de comprimento e 10 cm de largura, são trilobadas e são formadas por 3 nervuras centrais. Inserem-se em lados opostos nos caules, de base arredondada e com as margens serrilhadas. Observando com atenção, é possível notar que as folhas mais jovens são geralmente acuminadas, as margens são inteiras ou ligeiramente dentadas. Por outro lado, as folhas maduras tendem a apresentar lóbulos mais largos e as margens são grosseiramente dentadas. Durante a estação outonal, (/glossary/387) as folhas tornam-se de cor avermelhada.

As flores, de cor branca, dispõem-se em inflorescências grandes e muito vistosas do tipo corimbo, (/glossary/191) medindo até 13 cm de diâmetro. As flores presentes nas margens da inflorescência (/glossary/329) são estéreis e são compostas por 5 pétalas brancas, planas e alargadas. A parte central formada por flores mais pequenas, férteis, com 5 pétalas mais curtas de cor branca ou creme.

O fruto é uma pequena drupa (/glossary/222) globosa, vermelha quando madura, no qual está contida uma semente (/glossary/482) de cor esbranquiçada.

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Tipo de Fruto

drupa (/glossary/222)

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

lobado

(que está dividido em lobos, isto é, partições que não alcançam o meio do limbo.)

Habitat

Ocorre preferencialmente em florestas húmidas ricas em nutrientes e ao longo das margens dos cursos de água.

Observações

As folhas do *V.trilobum* assemelham-se a folhas de ácer.

Aplicações

É utilizado como planta ornamental (/glossary/385) devido às suas atraen flores e à coloração das suas folhas durante o outono. Os frutos podem se utilizados na culinária para a confecção de compotas e geleias.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco