

Berberis thunbergii DC.

7 Exemplares no Parque



Família

Berberidaceae

Nome Comum

bérberis, uva-espim-do-japão

Origem

Centro e Sul do Japão. Encontra-se naturalizado no Canadá, E.U.A. e Europa central.

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

DC.

Descrição

A bérberis ou uva-espim-do-japão é um arbusto (/glossary/104) denso de folhagem (/glossary/282) caduca, de formato arredondado (/glossary/136) com numerosos caules de cor castanha a avermelhada, podendo atingir 2 metros de altura. A casca (/glossary/171) interior é geralmente de cor amarelada. Esta espécie (/glossary/244) é facilmente identificada pela presença de espinhos pontiagudos (/glossary/441) ao longo dos ramos.

As folhas, de cor verde-escuro (/glossary/484) durante a primavera e avermelhadas durante o outono, nascem nas axilas das folhas e dispõem alternadamente nos caules, medindo até 3 cm de comprimento. São simples (/glossary/493) de formato obovado (/glossary/378) a oblongo, (/glossary/ estreitadas na base e as margens são inteiras. As flores, de cor amarelo pálido, dispõem-se em cachos umbeliformes, surgindo agrupadas em conjuntos de 3 a 5 flores.

O fruto é uma pequena baga (/glossary/146) avermelhada quando madura, de formato elipsoide, (/glossary/228) com 8 mm de comprimento, que contém uma semente. (/glossary/482)

Forma de Vida

arbusto (/glossary/104)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

bagas (/glossary/146)

Consistência do Fruto

carnudo (/glossary/168)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ; longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice)

Habitat

Ocorre frequentemente em matagais. (/glossary/358)

Observações

É altamente resistente a podas, sendo muito utilizado na formação de sebes em jardins e espaços urbanos. Para além da espécie-tipo, (/glossary/244) existem ainda variedades cultivadas muito utilizadas como planta ornamental (/glossary/385) nomeadamente, a *Berberis thunbergii* DC. 'Atropurpurea' (folhagem (/glossary/282) púrpura) e a *Berberis thunbergii* DC. 'Atropurpurea Nana' (com porte (/glossary/442) anão). É considerada uma espécie (/glossary/244) com carácter invasor em alguns países.

Aplicações

A bérberis é polinizada por abelhas e os seus frutos são um atrativo para diversas aves, servindo como fonte de alimento. Consequentemente, as sementes desta planta são espalhadas pelos (/glossary/414) pássaros, crescendo em diversas áreas, tais como campos, bosques e zonas húmidas.

Porte



Folha



Flor



Fruto

Tronco