

Acer campestre L.

12 Exemplares no Parque



Família

Sapindaceae

Nome Comum

bordo, ácer, ácer-campestre, bordo-comum

Origem

Europa (Dinamarca, Polónia e Bielorrússia), sudoeste da Ásia (Turquia ao Cáucaso) e norte de África (montanhas do Atlas).

Tipo de Origem

alóctone (/glossary/116)

Autor

L.

Descrição

O ácer-campestre é uma árvore (/glossary/137) caducifólia que pode chegar aos 20 m de altura. As folhas são opostas, longamente pecioladas, algo coriáceas e de cor mais pálida na página (/glossary/394) inferior; quando novas possuem muitos pelos, (/glossary/414) medem geralmente de 3 a 8 cm e são cordiformes na base e palmadas, com 5 lobos profundos e obtusos, os exteriores são, por vezes, muito reduzidos, podendo mesmo não existir. As flores estão dispostas em inflorescências pendentes, corimbosas; (/glossary/103) verdes, com cálice (/glossary/163) e corola (/glossary/193) bem desenvolvidos. São quase sempre (/glossary/484) unissexuais, mas também podem ser poligâmicas. O fruto (sâmara) (/glossary/478) é provido de 2 asas membranosas, que se estreitam um pouco na base e acabam por se afastar, formando um ângulo próximo de 180°.

Tipo de Reprodução

monóica (/glossary/547)

Forma de Vida

árvore (/glossary/137)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

sâmara (/glossary/478)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também ser simples ou composto.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

lobada

(dividida em lobos, isto é, partições que alcançam frequentemente o meio do limbo.)

Limbo da Folha

lobado

(que está dividido em lobos, isto é, partições que não alcançam o meio do limbo.)

Habitat

Isolados nas orlas dos bosques ou formando pequenos bosquetes em zonas carvalhais, castinçais, sobre solos frescos, sem preferência edáfica.

Observações

Cultiva-se frequentemente como árvore (/glossary/137) de sombra e tambo para formar sebes, pois aguenta muito bem as podas. Muito semelhante à zelha (*Acer monpessulanum*), sendo frequentemente confundido com esta, entantanto as folhas da zelha são mais ásperas e mais pequenas, só com 3 lóbulos de tamanho semelhante, ovados e inteiros e asas do fruto em ângulo agudo (/glossary/114) ou paralelo.

Aplicações

A madeira desta espécie (/glossary/244) é dura, compacta e amarelada, e apreciada em carpintaria para móveis. Outrora as suas folhas e brotos, eram utilizados como alimento para o gado.

Porte




Folha



Flor



Fruto



Tronco

